[患部]胃

[バイタル] 80(99)

[手術時間] 5:00:00



一 出演命令 一

The patient's Life is in your hands	
腹部を消毒して切開(切開→P24)	10
MAIN CHILDREN WAS TO SEE	
2 腫瘍×3を特定し、すべて切開する(腫瘍→P26)	0
3 腫瘍×3の組織液をまとめて吸引し、3つの腫瘍	2
を順番に切り離す(腫瘍→P26)	
The second secon	
4 腫瘍×3を取り除き、追加トレイにある人工膜を切除痕に乗せて定着させる(腫瘍→P26)	
除限に来せ(定着させる(腫場→P26)	
発生した小腫瘍を焼却し、レーザー痕を1ヵ所だ	40
け残すように治療(小腫瘍→P27)	
6 バイタルを90付近まで回復させ、残ったレーザー	10
痕を治療(バイタル回復→P23、小腫瘍→P27)	
7 右上に発生した腫瘍×2を特定し、すべて切開する	•
(腫瘍→P26)	
腫瘍の組織液と周囲にある血溜まりを吸引し、腫	2
瘍を切り離す(腫瘍→P26、血溜まり→P24)	
700 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
1 腫瘍を取り除き、追加トレイにある人工膜を切除	10
痕に乗せて定着させる(腫瘍→P26)	
発生した小腫瘍をまとめて焼却し、レーザー痕を はなぎ(よ) 野原 (POZ)	40
治療(小腫瘍→P27)	
術野を上に移動し、腫瘍を切開(腫瘍→P26)	0
12 ①~①の手順で腫瘍と血溜まりを処置	21
(腫瘍→P26、血溜まり→P24)	5/-
3 術野を下に移動し、腫瘍×2を切開(腫瘍→P26)	0/
4   腫瘍の組織液を吸引しようとすると、ドレーンが故	Qu'
障するイベントが発生	
15 ドレーンが使用できるまでバイタルを回復	
(バイタル回復→P23)	
16 ドレーン復活後に心細動が発生し、心停止後に	*

17 バイタルを回復	[(バイタル回復→P23)	1
18 胃の右上部に	発生した血溜まりと腫瘍×2の組	0
織液を吸引(血	□溜まり→P24、腫瘍→P26)	
19 0~0の手順	で腫瘍と血溜まりを処置	21
(腫瘍→P26、	血溜まり→P24)	<b>%</b> /
20 術野を左下に	多動	•
21 血溜まりをすべ	て吸引し、バイタルを回復する	2
(血溜まり→P	24、バイタル回復→P23)	
22 腫瘍×3を特定	でし、すべて切開する(腫瘍→P26)	0\
23 0~0の手順	で腫瘍、血溜まり、小腫瘍を処置	21
(腫瘍→P26、	血溜まり→P24、小腫瘍→P27)	<b>*</b>
24 腹部の閉創処	置を行なう(閉創→P25)	5
The patient is	saved	
510	Time Limit	



人工膜を乗せるときは血溜まりに注意。切除痕の周囲に 血溜まりがあると、新たな人 工膜が必要になる。



約20秒間ドレーンが使用不 可になる。そのあいだはバイ タルが下がっていくので、しっ かりと回復させておこう。



素早く腫瘍の処置ができるな らバイタル回復を後回しにし 、腫瘍除去中にバイタルの 回復を行なってもいい。

## SPECIAL BONUS

心臓マッサージを6回行なう(心細動→P31)

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し				1.3
○○秒以上残して手術終了 ※	80	100	110	1.2
MAX CHAIN 〇〇〇以上	120	180	190	1.2
Cool 判定〇〇回以上取得	5	10	12	1.3

## **OPERATION RANK**

ランク	Easy	Normal	Hard
С	0~4199	0~6199	0~7799
В	4200 ~ 4399	6200 ~ 6499	7800 ~ 7999
Α	4400 ~ 4599	6500 ~ 6699	8000 ~ 8299
S	4600 ~	6700 ~	8300 ~ 8499
XS		_	8500 ~



[患部]大腸

[バイタル] 80(99)

[手術時間] 5:00:00

一対決一

he patient's Life is in your hands	/	77 薬の効果が
腹部を消毒して切開(切開→P24)	61	回ずつ投与
版命を月母して切開(切開)で24)		回,力技子
動脈瘤に鎮静剤(茶色の液体)を投与し、ガイド	11	18 左下の動脈
ラインに沿って瘤を切り離す(動脈瘤→P33)		薬の効果が
プープ 1011 プ (周 と 43 7 7 年 年 1 30 7		回ずつ投与
瘤を取り除き、血溜まりを吸引(動脈瘤→P33)	1	
		19 右上の動脈
血管を繋げ 接合部分を縫合(動脈瘤→P33)	19	薬の効果が
and a copy of the property of		回ずつ投与
巨大動脈瘤に鎮静剤を投与し、ガイドラインに沿	11	
って瘤を切り離す(巨大動脈瘤→P33)		20 巨大動脈瘤
- CAMIC JA FIELD ( INC.)		ガイドライン
瘤を取り除き、血溜まりを吸引(動脈瘤→P33)	100	処置する(目
All Copy of the Community of the State of th		
追加トレイの人工血管を血管と血管のあいだに	-	21 最後に残っ
配置(巨大動脈瘤→P33)		置する(巨大
HOLE ( EL YAMANIA TOO)		
血管の接合部分×3を縫合(巨大動脈瘤→P33)	9	22 腹部の閉創
		T
バイタルを回復(バイタル回復→P23)		The patient i
	*	
動脈瘤×2に鎮静剤を投与(動脈瘤→P33)	1	VITALS ©
**	7	2
術野を左に移動させて鎮静剤を巨大動脈瘤、動	011	
脈瘤の順に投与し、巨大動脈瘤の瘤を切り離す		
(巨大動脈瘤→P33、動脈瘤→P33)		100
		MUNIOR
2 6~3の手順で巨大動脈瘤だけを先に処置する	0019	110
(巨大動脈瘤→P33)		VITALS
		870
3 術野を右に戻し、右下にある動脈瘤を2~4の	01	4400
手順で処置する(動脈瘤→P33)	0225	
4 術野を左に移動させ、動脈瘤を2~4の手順で	011	500
処置する(動脈瘤→P33)	01/5	<b>国际</b> 网络阿尔
		- /2
5 術野を右上に移動させ、動脈瘤を②~●の手順	011	VITALS
で処置する(動脈瘤→P33)	02/5	45
		9
6 巨大動脈瘤×2に鎮静剤を2回ずつ投与し、続け	1	
て左下 右上の動脈瘤の順に鎮静剤を投与		490
(巨大動脈瘤→P33、動脈瘤→P33)		INDERIOR

が切れた巨大動脈瘤×2に鎮静剤を2 (巨大動脈瘤→P33)

係瘤を②~○の手順で素早く処置し、 が切れた巨大動脈瘤×2に鎮静剤を2 (動脈瘤→P33、巨大動脈瘤→P33)

ќ瘤を2~○の手順で素早く処置し、 が切れた巨大動脈瘤×2に鎮静剤を2 (動脈瘤→P33、巨大動脈瘤→P33)

雷(あとに鎮痛剤を投与した側)の瘤を ンに沿って切り離し、 ①~ ②の手順で 巨大動脈瘤→P33)

った巨大動脈瘤を 0~0の手順で処 大動脈瘤→P33)

リ処置を行なう(閉創→P25)



巨大動脈瘤には2回鎮静剤 を打つ必要がある。ただし2 回目は微量でいいので、余っ た分は動脈瘤に投与しよう。



この動脈瘤を処置中に別の 動脈瘤が発生する。発生位 置のことを考え、動脈瘤が左 上になる位置で処置しよう。



安全に進めるなら、瘤を取り 除くまえにバイタルを回復。 準備ができたら処置を続け、 次の動脈瘤発生に備える。

SPE	CIA	LBO	JNL	IS

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し				1.3
○○秒以上残して手術終了 ※	110	140	130	1.2
MAX CHAIN 〇〇〇以上	45	50	60	1.2
動脈瘤を破裂させない				1.3
※分表示ではそれぞれ、Easy1:50 Normal2:	20 Hard2:10			disconsissions

## **OPERATION RANK**

率	ランク	Easy	Normal	Hard
.3	C	0 ~ 5799	0 ~ 6799	0~7999
.2	В	5800 ~ 5899	6800 ~ 7099	8000 ~ 8199
.2	A	5900 ~ 6049	7100 ~ 7299	8200 ~ 8499
.3	S	6050 ~	7300 ~	8500 ~ 8699
annument of	XS		-	8700 ~